



Einnahmezeitpunkte- Orale Krebsmedikation

„Altsubstanzen“, klassische Zytostatika, Nicht- Kinaseinhibitoren

Einnahme mit der Nahrung	Einnahme ohne Nahrung	Egal
Mitotane ¹	Chlorambucil	Busulfan
Vinorelbin	Cyclophosphamid ²	Capecitabin ³
	Estramustinphosphat	Etoposid
	Lomustin	Fludarabin
	Melphalan	Hydroxycarbamid
	Methotrexat	Idarubicin
	Tegafur : Uracil (1:4)	Lenalidomid
	Temozolomid	Pomalidomid
	Tioguanin	Procarbazin
	Trifluridin : Tipiracil (1:0,5)	Tegafur : Gimeracil : Oteracil (S1)
		Thalidomid
		Topotecan
¹ Am besten mit fettreicher Mahlzeit oder Schokolade oder Milch		
² vorzugsweise nüchtern, bei GI Problemen mit der Nahrung möglich		
³ Mit der Mahlzeit besser verträglich		
Mercaptopurin	Es gibt nur den Hinweis, 6-MP mit reichlich Flüssigkeit einzunehmen	
Treosulfan	Soll unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit eingenommen werden	
Trofosamid	Vor, während bzw. unmittelbar nach der Gabe sollten die Patienten ausreichende Mengen Flüssigkeit zu sich nehmen	

Stand 10/2021 (in der EU und den USA zugelassene Präparate)

Autor: Jürgen Barth, Apotheker für Klinische Pharmazie & Onkologische Pharmazie, Med. Klinik IV-Hämatologie, Leiter der Stil Studienzentrale, Universitätsklinikum Gießen-Marburg



Kinase- und sonstige Enzyminhibitoren

Einnahme mit der Nahrung	Einnahme ohne Nahrung	Egal
Alectinib	Afatinib	Abemaciclib
Alpelisib	Avapritinib	Acalabrutinib
Bosutinib	Cabozantinib	Axitinib
Ibrutinib	Ceritinib	Binimetinib
Imatinib	Dabrafenib	Brigatinib
Midostaurin	Erlotinib (BV+)	Capmatinib
Neratinib	Everolimus	Cobimetinib
Nintedanib (BVn = 4,69%)	Infigratinib	Crizotinib
Palbociclib (Hartkapseln)*	Lapatinib (BV+)	Dacomitinib
Regorafenib mit (fettarmem) Frühstück	Nilotinib (BV+)	Dasatinib
Tepotinib	Pazopanib (BV+)	Duvelisib
Umbralisib	Pexidartinib (BV+)	Encorafenib
	Pralsetinib (BV+)	Entrectinib
	Selumetinib	Erdafitinib
	Sorafenib	Gefitinib
	Trametinib	Gilteritinib
		Idelalisib
		Larotrectinib
		Lenvatinib
		Lorlatinib
		Osimertinib
		Palbociclib (Filmtabletten)
		Pemigatinib
		Ponatinib
		Ribociclib
		Ripretinib
		Selpercatinib
		Sunitinib
		Tivozanib
		Tucatinib
		Vandetanib
		Vemurafenib
		Zanubrutinib
(BV+): muss nüchtern eingenommen werden, da mit der Nahrung die Bioverfügbarkeit steigt		
*nur noch in einigen EU- Ländern am Markt. Werden auch dort sukzessive durch die Filmtbl. ersetzt.		

Stand 10/2021 (in der EU und den USA zugelassene Präparate)

Autor: Jürgen Barth, Apotheker für Klinische Pharmazie & Onkologische Pharmazie, Med. Klinik IV-
Hämatologie, Leiter der Stil Studienzentrale, Universitätsklinikum Gießen-Marburg



Sonstige Enzyminhibitoren

Einnahme mit der Nahrung	Einnahme ohne Nahrung	Egal
Venetoclax	Ixazomib	Enasidenib
	Olaparib Kps (BV+) #	Glasdegib
	Panobinostat	Ivosidenib
	Sonidegib	Niraparib
		Olaparib Tbl
		Rucaparib
		Selinexor
		Sotorasib
		Talazoparib
		Tazemetostat
		Vismodegib
(BV+): muss nüchtern eingenommen werden, da mit der Nahrung die Bioverfügbarkeit steigt		
# Produktion der Hartkapseln läuft zum Ende 2021 aus. Werden durch die Tbl. ersetzt! Siehe auch: https://www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/Weitere/20210629.pdf		

Stand 10/2021 (in der EU und den USA zugelassene Präparate)