

Moderne orale Tumorthapeutika, während dessen Einnahme ausgewähltes Obst (Grapefruit et al.) vermieden werden muss

| Frucht ⇒ INN ↓ | Grapefruit | Klementinen / Bitterorangen | Sternfrucht | Granatapfel |
|---|------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Abemaciclib | X | | | |
| Axitinib | X | | | |
| Bosutinib | X | | | |
| Brigatinib | X | | | |
| Cabozantinib | X | | | |
| Ceritinib | X | | | |
| Cobimetinib | X | | | |
| Crizotinib | X | | | |
| Encorafenib | X | | | |
| Entrectinib | X | | | |
| Everolimus | X (n.u.) | | | |
| Ibrutinib | X | X | | |
| Infigratinib | X | | | |
| Lapatinib | X | | | |
| Larotrectinib | X | | | |
| Lorlatinib | X | | | |
| Mobocertinib | X | | | |
| Neratinib | X | | | |
| Nilotinib | X | | | |
| Olaparib | X | X (FPI) | | |
| Palbociclib | X | | | |
| Panobinostat | X | X | X | X |
| Pazopanib | X | | | |
| Pemigatinib | X | | | |
| Pexidartinib | X | | | |
| Ponatinib | X | | | |
| Regorafenib | X | | | |
| Ribociclib | X | | | X |
| Selumetinib | X | | | |
| Sunitinib | X | | | |
| Venetoclax | X | X | X | |
| Stand 02/2022 n.u.: Nicht untersucht. Erhöhte Exposition erwartet (die Wirkung variiert stark). Die Kombination sollte vermieden werden. | | | | |

Quellen:

Fachinformation und/oder der US-amerikanischen Gebrauchsinformation (FPI = Full Prescribing Information) der jeweiligen Präparate