

<b>Scemblix®</b>			
<b>ALLGEMEINES</b>	Wirkstoff	Asciminib	
	Wirkstoffklasse	Proteinkinaseinhibitor	
	Darreichungsform	20/40 mg Filmtabletten	
	Wirkmechanismus/Target	BCR-ABL (STAMP)	
	Zugelassene Indikation(en)	Chronische Myeloische Leukämie (CML) (Philadelphia-Chromosom positiv, Ph <sup>+</sup> )	
	Einnahmевorschrift	1 h vor oder 2 h nach Mahlzeit	
<b>DOSIERUNG</b>	Regeldosierung	40 mg 1-0-1-0	
	DATox	20 mg 1-0-1-0	
	DANI	Nicht erforderlich	
	DALI	Nicht erforderlich	
	Vergessene Dosis	Nachholen, wenn > 6 Stunden bis zur nächsten Dosis	
	Erbrochene Dosis	k. A.	
<b>WECHSELWIRKUNGEN</b>	Metabolisierung (Hauptabbauweg)	CYP3A4/5 Substrat	
	Wirkung auf orales Tumorthapeutikum (Auswahl)	Den Magen-pH-Wert erhöhende Medikamente	k. A.
		CYP3A4/5-Induktoren (starke)	Vorsicht
		CYP3A4/5-Induktoren	k. A.
	Wirkung auf Begleitmedikation (Auswahl)	Inhibitor von CYP3A4/5	Klinische Überwachung bei Substraten mit enger therapeutischer Breite
		Inhibitor von CYP2C9	Klinische Überwachung bei Substraten mit enger therapeutischer Breite



<b>NEBENWIRKUNGEN</b>	Sehr häufige, für <b>Patienten</b> relevante Nebenwirkungen ( <i>Auswahl</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diarrhö</li> <li>■ Übelkeit und/oder Erbrechen</li> <li>■ Hautausschlag und/oder Juckreiz</li> <li>■ Hypertonie</li> <li>■ Myalgie und/oder Arthralgie</li> <li>■ Fatigue</li> </ul>	
	Warnhinweise und/oder Vorsichtsmaßnahmen für <b>Fachkreise</b> ( <i>Auswahl</i> )	<b>Warnhinweis</b>	<b>Maßnahme</b>
		Hämatologische Toxizität	Symptomüberwachung Großes Blutbild <i>in den ersten 3 Monaten alle 2 Wochen, dann einmal im Monat bzw. bei klinischer Indikation</i>
		Pankreastoxizität	Symptomüberwachung und Bestimmung Serumlipase- und Serumamylase <i>monatlich oder bei klinischer Indikation</i>
		QT-Intervall-Verlängerung	EKG <i>vor Beginn, dann wie klinisch angezeigt, Vorsicht bei Risikopatienten</i> Serum-Elektrolyte <i>vor Beginn, dann wie klinisch angezeigt</i>
		Hypertonie	Symptomüberwachung <i>insbesondere bei Risikopatienten</i>
	Reaktivierung Hepatitis B	Status <i>vor Beginn</i>	
<b>SONSTIGES</b>	Prophylaxen	Minimal bis gering emetogen [NCCN]	
	Suspendierbarkeit	k. A.	

**Autoren** Pauline Dürr und Dr. Katja Schlichtig  
 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg  
 Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie,  
 FAU Erlangen-Nürnberg und Apotheke des Universitätsklinikums Erlangen  
 Fahrstraße 17, 91054 Erlangen



**Legende**

- DA = Dosisanpassung
- DATox = Dosisanpassung bei Toxizität
- DANI = Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz
- DALI = Dosisanpassung bei Leberinsuffizienz
- STAMP = specifically targeting the ABL myristoyl pocket

**Quellen**

- Fachinformation Scemblix®, Stand September 2022
- NCCN Guideline Antiemesis, Version 2.2022

