



Einnahmezeitpunkte- Orale Krebsmedikation

„Altsubstanzen“, klassische Zytostatika, Nicht- Kinaseinhibitoren

Einnahme mit der Nahrung	Einnahme ohne Nahrung	Egal
Capecitabin ¹	Chlorambucil	Anagrelid
Mitotane ²	Etoposid ⁴	Azacitidin
Tretinoin	Lomustin ⁸	Bexaroten
Trifluridin : Tipiracil (1 : 0,5) ³	Melphalan ⁹	Busulfan
Vinorelbin	Methotrexat	Cyclophosphamid ⁵
	Decitabin/ Cedazurin	Fludarabin
	Tegafur : Gimeracil : Oteracil (S1)	Hydroxycarbamid
	Tegafur : Uracil (1:4)	Idarubicin
	Temozolomid ⁴	Lenalidomid
	Tioguanin ⁴	Mercaptopurin ⁶
		Pomalidomid
		Procarbazin
		Thalidomid
		Topotecan
		Treosulfan ⁷
		Trofosfamid ⁵
¹ Mit der Mahlzeit besser verträglich, deshalb innerhalb 30 Min nach einer Mahlzeit		
² Am besten mit fettreicher Mahlzeit		
³ innerhalb 1 Stunde nach einer Mahlzeit		
⁴ auf nüchternen Magen		
⁵ dazu ausreichend trinken, keine genauen Angaben zur Mahlzeit in FI		
⁶ immer entweder mit oder ohne Mahlzeit, mindestens 1 Stunde vor oder 2 Stunden nach Milchprodukten		
⁷ mit Milch oder Nahrung besser verträglich		
⁸ mindestens 3 Stunden nach einer Mahlzeit oder abends vor dem Schlafengehen		
⁹ mindestens 30 Minuten vor einer Mahlzeit		
FDA-Zulassung / keine orale Darreichungsform in D		

Autor: Jürgen Barth, Apotheker für Klinische Pharmazie & Onkologische Pharmazie,
Universitätsklinikum Gießen-Marburg; Aktualisierung: Oralia-DB Redaktion;

Quelle: Deutsche Fachinformationen (FI) bzw. bei nicht in D zugelassenen die FPI ; Stand: 07/2023;

Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewährleistung für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und keinerlei Haftung für eventuelle Fehler übernommen.



Kinase- Inhibitoren I

Einnahme mit der Nahrung	Einnahme ohne Nahrung	Egal
Alectinib	Afatinib	Abemaciclib
Alpelisib ¹	Asciminib	Acalabrutinib
Bosutinib	Avapritinib (BV+)	Axitinib
Ceritinib ⁵	Cabozantinib (BV+)	Binimetinib
Imatinib	Dabrafenib	Brigatinib
Midostaurin	Erlotinib (BV+)	Capmatinib
Neratinib	Infigratinib	Cobimetinib
Nintedanib	Lapatinib (BV+)	Crizotinib
Regorafenib ²	Nilotinib (BV+)	Dacomitinib
Tepotinib	Pazopanib (BV+)	Dasatinib
Umbralisib	Pexidartinib (BV+)	Duvelisib
	Pralsetinib (BV+)	Encorafenib
	Selumetinib	Entrectinib
	Trametinib	Erdafitinib
		Everolimus ³
		Fedratinib
		Futibatinib
		Gefitinib
		Gilteritinib
		Ibrutinib ⁴
		Idelalisib
		Larotrectinib
		Lenvatinib
		Lorlatinib
		Mobocertinib
		Osimertinib
		Palbociclib
		Pemigatinib
		Ponatinib
		Ribociclib
		Ripretinib
		Ruxolitinib
¹ unmittelbar nach Mahlzeit		
² nach leichter Mahlzeit		
³ immer entweder mit oder immer ohne Mahlzeit		
⁴ keine genauen Angaben zur Mahlzeit in FI (BV+)		
⁵ Die Mahlzeit kann von einer leicht bis hin zu einer vollwertigen Mahlzeit variieren.		
(BV+): muss nüchtern eingenommen werden, da mit der Nahrung die Bioverfügbarkeit steigt		
FDA-Zulassung / keine orale Darreichungsform in D		

Autor: Jürgen Barth, Apotheker für Klinische Pharmazie & Onkologische Pharmazie,
Universitätsklinikum Gießen-Marburg; Aktualisierung: Oralia-DB Redaktion;

Quelle: Deutsche Fachinformationen (FI) bzw. bei nicht in D zugelassenen die FPI ; Stand: 07/2023;

Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewährleistung für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und keinerlei Haftung für eventuelle Fehler übernommen.



Kinase- Inhibitoren II

Einnahme mit der Nahrung	Einnahme ohne Nahrung	Egal
		Selpercatinib
		Sorafenib ⁶
		Sunitinib
		Tivozanib
		Tucatinib
		Vandetanib
		Vemurafenib
		Zanbrutinib

⁶ unabhängig von Mahlzeit oder zusammen mit einer leicht oder mäßig fettreichen Mahlzeit, bei fettreicher Mahlzeit mindestens 1 Stunde vor oder 2 Stunden nach der Mahlzeit

Sonstige Enzyminhibitoren

Einnahme mit der Nahrung	Einnahme ohne Nahrung	Egal
Venetoclax	Ixazomib	Adagrasib
	Olutasidenib	Enasidenib
	Sonidegib (BV+)	Glasdegib
		Ivosidenib
		Niraparib
		Olaparib
		Panobinostat
		Rucaparib
		Selinexor
		Sotorasib
		Talazoparib
		Tazemetostat
		Vismodegib

(BV+): muss nüchtern eingenommen werden, da mit der Nahrung die Bioverfügbarkeit steigt

FDA-Zulassung / keine orale Darreichungsform in D

Hormonpräparate

Einnahme mit der Nahrung	Einnahme ohne Nahrung	Egal
Darolutamid	Abirateron (BV+)	Anastrozol
		Apalutamid
		Bicalutamid
		Enzalutamid
		Exemestan
		Letrozol
		Relugolix

(BV+): muss nüchtern eingenommen werden, da mit der Nahrung die Bioverfügbarkeit steigt

Autor: Jürgen Barth, Apotheker für Klinische Pharmazie & Onkologische Pharmazie,
Universitätsklinikum Gießen-Marburg; Aktualisierung: Oralia-DB Redaktion;

Quelle: Deutsche Fachinformationen (FI) bzw. bei nicht in D zugelassenen die FPI ; Stand: 07/2023;

Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewährleistung für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und keinerlei Haftung für eventuelle Fehler übernommen.